DIAGRAMA DE DECISIÓN EN GATOS - LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: DETERMINACIÓN DE LA FASE Y NUTRICIÓN

ROYAL CANIN®

Revisión anual o historia y/o exploración física que sugiera ERC

Creat. persistente < 1,6mg/dL 140µmol/L

SDMA persistente < 14µg/dl	SDMA persistente > 14µg/dl o historial de enfermedad renal
Función renal adecuada	CKD Fase I
SENIOR CONSULT Stage 1 DIETS	**SENIOR CONSULT Stage 2 DIETS**
• Volver a valorar una vez al año • Si existe proteinuria renal, consulta las directrices de la IRIS para el tratamiento de la glomerulopatía y volver a valorar cada 6 meses	• Volver a valorar al menos cada 6 meses • Comprueba también la proteinuria renal y la presión arterial

Creat. persistente > 1,6mg/dL 140µ-mol/L

CKD Fase II	CKD Fase III	CKD Fase IV
• **CREAT.** 1.6 – 2.8 mg/dL 140 – 250 µmol/L • **SDMA** > 14 µg/dL	• **CREAT.** 1.6 – 2.8 mg/dL 140 – 250 µmol/L • **SDMA** ≥ 25 µg/dL • **Baja PCC** O • **CREAT.** 2.9 – 5.0 mg/ dL 251 – 440 µmol/L • **SDMA** > 14 µg/dL	• **CREAT.** 2.9 – 5.0 mg/dL 251 – 440 µmol/L • **SDMA** ≥ 45 µg/dL • **Baja PCC** O • **CREAT.** > 5.0 mg/dL > 440 µmol/L • **SDMA** >14 µg/dL

DIETAS RENAL

Ten en cuenta que este algoritmo ofrece pautas básicas
Naturalmente, cada veterinario debe aplicar su propio criterio médico cuando se trata de sus pacientes. Cada paciente es un individuo que necesita seguimiento y revisión para garantizar que está recibiendo la dieta más adecuada. Consulta las directrices de la IRIS para obtener todas las recomendaciones sobre el tratamiento de la ERC en gatos http://www.iris-kidney.com/guidelines/staging.html para ayudar a controlar las complicaciones posteriores que pueden surgir con la ERC. La ERC es una enfermedad progresiva, por lo que los animales deben evaluarse con frecuencia para asegurar que la dieta y el tratamiento se ajustan a sus necesidades individuales.

PCC: Puntuación de la condición corporal **ERC:** Enfermedad renal crónica **CREAT.:** creatinina **SDMA:** Dimetilarginina simétrica

©ROYAL CANIN® SAS 2017 - Todos los derechos reservados.