

ÁRVORE DE NUTRICIONAL PARA GATOS - A RESPOSTA ADEQUADA ÀS NECESSIDADES INDIVIDUAIS EM CADA ESTÁGIO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA.



Consulta anual geriátria ou
Sugestão na história clínica e/ou exame físico de DRC

Creat. persistente < 1,6mg/dL
140µmol/L

Creat. persistente > 1,6mg/dL
140µmol/L

SDMA persistente < 14µg/dL

DMAS persistente > 14µg/dL
ou história de doença renal

• **CREAT.** 1.6 – 2.8 mg/dL
140 – 250 µmol/L
• **DMAS** > 14 µg/dL

• **CREAT.** 1.6 – 2.8 mg/dL
140 – 250 µmol/L
• **DMAS** ≥ 25 µg/dL

• **ICC Baixo**

OU

• **CREAT.** 2.9 – 5.0 mg/dL
251 – 440 µmol/L
• **DMAS** > 14 µg/dL

• **CREAT.** 2.9 – 5.0 mg/dL
251 – 440 µmol/L
• **DMAS** ≥ 45 µg/dL

• **ICC Baixo**

OU

• **CREAT.** > 5.0 mg/dL
> 440 µmol/L
• **DMAS** > 14 µg/dL

Função renal normal

DRC Estágio I

DRC Estágio II

DRC Estágio III

DRC Estágio IV

SENIOR CONSULT
Stage 1 DIETS



SENIOR CONSULT
Stage 2 DIETS



DIETAS RENAL



• Reavaliar uma vez por ano
• Em caso de proteinúria,
consulte as orientações IRIS
sobre manejo de glomerulopatia
e reavaliar cada 6 meses

• Reavaliar pelo menos cada 6 meses
• Verifique também a proteinúria renal e a pressão arterial



Nota: Este algoritmo fornece as orientações básicas

Naturalmente, o médico veterinário deverá exercer o seu juízo médico em cada paciente. Cada paciente, individualmente, exige monitorização e reavaliação para garantirmos que recebe o alimento mais adequado. Para completar as suas recomendações no tratamento à DRC no cão, refira as orientações IRIS <http://www.iris-kidney.com/guidelines/staging.html> o que ajudará no manejo das complicações de DRC. A DRC é uma doença progressiva e os animais devem ser monitorizados frequentemente, o que permite garantir e ajustar a nutrição e o tratamento às necessidades individuais de cada um.