



PRODUCT BOOK



MANEJO NUTRICIONAL DE LAS ENFERMEDADES DEL TRACTO URINARIO INFERIOR EN PERROS Y GATOS



DISOLUCIÓN DE CRISTALES Y CÁLCULOS DE ESTRUVITA
PREVENCIÓN DE CÁLCULOS DE OXALATO CÁLCICO Y DE CRISTALES Y CÁLCULOS DE ESTRUVITA ESTÉRILES



DISOLUCIÓN DE CRISTALES Y CÁLCULOS DE ESTRUVITA
PREVENCIÓN DE CRISTALES Y CÁLCULOS DE ESTRUVITA Y DE OXALATO CÁLCICO



URINARY S/O



Disponible en envases de 400 g, 1,5 kg, 3,5 kg, 7 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

| | PESO DEL GATO (kg) | CONDICIÓN CORPORAL | | | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|-----------|-------|
| | | DELGADO | | NORMAL | | SOBREPESO | |
| | | gramos | vasos | gramos | vasos | gramos | vasos |
| GATO ADULTO | 2 | 39 | 4/8 | 33 | 3/8 | 26 | 2/8 |
| | 2,5 | 46 | 4/8 | 38 | 4/8 | 31 | 3/8 |
| | 3 | 52 | 5/8 | 44 | 4/8 | 35 | 3/8 |
| | 3,5 | 59 | 5/8 | 49 | 5/8 | 39 | 4/8 |
| | 4 | 64 | 6/8 | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 |
| | 4,5 | 70 | 6/8 | 58 | 5/8 | 47 | 4/8 |
| | 5 | 75 | 7/8 | 63 | 6/8 | 50 | 5/8 |
| | 5,5 | 81 | 1 | 67 | 6/8 | 54 | 5/8 |
| | 6 | 86 | 1 | 72 | 7/8 | 57 | 5/8 |
| | 6,5 | 91 | 1 | 76 | 7/8 | 61 | 6/8 |
| | 7 | 96 | 1 + 1/8 | 80 | 7/8 | 64 | 6/8 |
| | 7,5 | 101 | 1 + 1/8 | 84 | 1 | 67 | 6/8 |
| | 8 | 105 | 1 + 2/8 | 88 | 1 | 70 | 6/8 |
| | 8,5 | 110 | 1 + 2/8 | 92 | 1 + 1/8 | 73 | 7/8 |
| | 9 | 115 | 1 + 3/8 | 96 | 1 + 1/8 | 76 | 7/8 |
| | 9,5 | 119 | 1 + 3/8 | 99 | 1 + 1/8 | 79 | 7/8 |
| | 10 | 123 | 1 + 3/8 | 103 | 1 + 2/8 | 82 | 1 |

Urinary S/O es un alimento dietético completo para gatos, formulado para disolver los cálculos de estruvita y reducir su recurrencia, gracias a sus propiedades acidificantes de la orina y sus bajos niveles de magnesio. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de su utilización. Administrar Urinary S/O durante 5-12 semanas para lograr la disolución de los cálculos de estruvita, y hasta 6 meses para reducir su recurrencia. Una vez transcurrido este tiempo, el gato debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario el tratamiento a largo plazo. El gato debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA:- Se recomienda Urinary S/O Feline en formato húmedo para los casos de cistitis idiopática recurrente. -Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O Feline.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y control de recurrencias.
- Urolitos de oxalato de calcio: control de recurrencias.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.



DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA

Ayuda a disolver todo tipo de cálculos de estruvita.



DILUCIÓN URINARIA

La dilución urinaria consigue que la orina sea menos propensa a formar cálculos de estruvita y de oxalato de calcio.



BAJA SOBRESATURACIÓN RELATIVA

Ayuda a reducir la concentración de iones que contribuyen a la formación de cristales.



BAJO NIVEL DE MAGNESIO

Nivel reducido de magnesio, un componente natural de los cristales de estruvita.

[S/O® INDEX] Este producto crea un entorno desfavorable para la formación de urolitos de oxalato y de estruvita en la orina.

| VALORES CLAVE | Por 1000 kcal | Por 100 g de alimento |
|-------------------------|---------------|-----------------------|
| Proteínas | 89,1 g | 34,5 g |
| Grasas | 38,7 g | 15 g |
| Carbohidratos | 85,7 g | 33,2 g |
| Fibra bruta | 7,5 g | 2,9 g |
| Fibra alimentaria fibre | 17,6 g | 6,8 g |
| Calcio | 2,3 g | 0,9 g |
| Fósforo | 2,3 g | 0,9 g |
| Potasio | 2,6 g | 1 g |
| Sodio | 3,4 g | 1,30 g |
| Cloruro | 5,8 g | 2,26 g |
| Magnesio | 0,1 g | 0,05 g |
| Cobre | 3,9 mg | 1,5 mg |
| Zinc | 43,9 mg | 17 mg |
| Taurina | 0,6 g | 0,23 g |
| Vitamina A | 6198,3 UI | 2400 UI |
| Vitamina E | 131,7 mg | 51 mg |
| Omega 6 | 8,7 g | 3,38 g |
| Omega 3 | 2,3 g | 0,88 g |
| EPA y DHA | 1 g | 0,37 g |
| Energía metabolizable* | 387 | |

*Calculada según NRC 2006.

COMPOSICIÓN

Arroz, gluten de trigo**, proteínas de ave deshidratadas, harina de maíz, grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, minerales, fibras vegetales, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).

*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutricionales: vitamina A: 21500 UI, vitamina D3: 800 UI, E1 (hierro): 37 mg, E2 (yodo): 3,7 mg, E4 (cobre): 11 mg, E5 (manganeso): 48 mg, E6 (zinc): 136 mg, E8 (selenio): 0,06 mg - Conservantes - Antioxidantes.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.

URINARY S/O



Disponible en cajas de 12 sobres de 85 g

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

| | PESO DEL GATO (kg) | CONDICIÓN CORPORAL | | | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | | DELGADO | | NORMAL | | SOBREPESO | |
| | | gramos | sobres | gramos | sobres | gramos | sobres |
| GATO ADULTO | 2 | 170 | 2 | 140 | 1 +1/2 | 110 | 1 +1/2 |
| | 2,5 | 195 | 2 +1/2 | 165 | 2 | 130 | 1 +1/2 |
| | 3 | 225 | 2 +1/2 | 185 | 2 | 150 | 2 |
| | 3,5 | 250 | 3 | 210 | 2 +1/2 | 165 | 2 |
| | 4 | 275 | 3 | 230 | 2 +1/2 | 185 | 2 |
| | 4,5 | 300 | 3 +1/2 | 250 | 3 | 200 | 2 +1/2 |
| | 5 | 325 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2 +1/2 |
| | 5,5 | 345 | 4 | 290 | 3 +1/2 | 230 | 2 +1/2 |
| | 6 | 365 | 4 +1/2 | 305 | 3 +1/2 | 245 | 3 |
| | 6,5 | 390 | 4 +1/2 | 325 | 4 | 260 | 3 |
| | 7 | 410 | 5 | 340 | 4 | 275 | 3 |
| | 7,5 | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3 +1/2 |
| | 8 | 450 | 5 +1/2 | 375 | 4 +1/2 | 300 | 3 +1/2 |
| | 8,5 | 470 | 5 +1/2 | 390 | 4 +1/2 | 315 | 3 +1/2 |
| | 9 | 490 | 6 | 410 | 5 | 325 | 4 |
| | 9,5 | 510 | 6 | 425 | 5 | 340 | 4 |
| | 10 | 530 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 |

Urinary S/O es un alimento dietético completo para gatos, formulado para disolver los cálculos de estruvita y reducir su recurrencia, gracias a sus propiedades acidificantes de la orina y sus bajos niveles de magnesio. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de su utilización. Administrar Urinary S/O durante 5-12 semanas para lograr la disolución de los cálculos de estruvita, y hasta 6 meses para reducir su recurrencia. Una vez transcurrido este tiempo, el gato debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario el tratamiento a largo plazo. El gato debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O Feline.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y control de recurrencias.
- Urolitos de oxalato de calcio: control de recurrencias.
- Cistitis idiopática felina (CIF).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.



CISTITIS IDIOPÁTICA

Gracias al elevado contenido de humedad de los alimentos húmedos, Urinary S/O Feline incrementa la dilución de la orina. Aproximadamente el 64% de las patologías del tracto urinario inferior en gatos (FLUTD, por sus siglas en inglés) son casos de cistitis idiopática; una dieta húmeda debe ser una opción prioritaria en casos de cistitis recurrente.



DISOLUCIÓN DE CÁLCULOS DE ESTRUVITA

Urinary S/O Feline disuelve de forma efectiva los urolitos de estruvita.



BAJA SOBRESATURACIÓN RELATIVA

Una orina subsaturada es un entorno en el que los cristales no pueden proliferar, por tanto es un medio desfavorable para la formación de cristales de estruvita y oxalato de calcio.



DILUCIÓN URINARIA

La dilución de la orina disminuye la concentración urinaria de estruvita y oxalato de calcio. Un mayor volumen urinario también garantiza la limpieza regular de la vejiga.

[S/O® INDEX] Este producto crea un entorno desfavorable para la formación de urolitos de oxalato y de estruvita en la orina.

| VALORES CLAVE | Por 1000 kcal | Por 100 g de alimento |
|-------------------------|---------------|-----------------------|
| Proteínas | 130,18 g | 11 g |
| Grasas | 41,42 g | 3,5 g |
| Carbohidratos | 33,14 g | 2,8 g |
| Fibra bruta | 11,83 g | 1 g |
| Fibra alimentaria fibre | 17,75 g | 1,5 g |
| Calcio | 2,96 g | 0,25 g |
| Fósforo | 2,96 g | 0,25 g |
| Potasio | 2,6 g | 0,22 g |
| Sodio | 3,55 g | 0,3 g |
| Cloruro | 4,73 g | 0,4 g |
| Magnesio | 0,19 g | 0,02 g |
| Cobre | 4,62 mg | 0,39 mg |
| Zinc | 30,77 mg | 2,6 mg |
| Taurina | 1,18 mg | 0,1 g |
| Vitamina A | 26035,5 UI | 2200 UI |
| Vitamina E | 118,34 mg | 10 mg |
| Omega 6 | 8,88 g | 0,75 g |
| Omega 3 | 1,89 g | 0,16 g |
| EPA y DHA | 1,07 g | 0,09 g |
| Energía metabolizable* | 85 | |

*Calculada según NRC 2006.

COMPOSICIÓN

Carnes y subproductos animales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, cereales, extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas, azúcares.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionales: vitamina D3: 50 UI, E1 (hierro): 3 mg, E2 (yodo): 0,3 mg, E4 (cobre): 2,5 mg, E5 (manganeso): 0,9 mg, E6 (zinc): 9 mg - Aditivos tecnológicos: (regulador de acidez) Bisulfato de sodio: 0,5 g.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.






Disponible en cajas de 12 sobres de 85 g

| GATO ADULTO | CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | PESO DEL GATO (kg) | CONDICIÓN CORPORAL | | | | | |
| | | DELGADO | | NORMAL | | SOBREPESO | |
| | | gramos | sobres | gramos | sobres | gramos | sobres |
| | 2 | 170 | 2 | 140 | 1 +1/2 | 110 | 1 +1/2 |
| | 2,5 | 195 | 2 +1/2 | 165 | 2 | 130 | 1 +1/2 |
| | 3 | 225 | 2 +1/2 | 185 | 2 | 150 | 2 |
| | 3,5 | 250 | 3 | 210 | 2 +1/2 | 165 | 2 |
| | 4 | 275 | 3 | 230 | 2 +1/2 | 185 | 2 |
| | 4,5 | 300 | 3 +1/2 | 250 | 3 | 200 | 2 +1/2 |
| | 5 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2 +1/2 |
| | 5,5 | 345 | 4 | 285 | 3 +1/2 | 230 | 2 +1/2 |
| | 6 | 365 | 4 +1/2 | 305 | 3 +1/2 | 245 | 3 |
| | 6,5 | 390 | 4 +1/2 | 325 | 4 | 260 | 3 |
| | 7 | 410 | 5 | 340 | 4 | 275 | 3 |
| | 7,5 | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3 +1/2 |
| | 8 | 450 | 5 +1/2 | 375 | 4 +1/2 | 300 | 3 +1/2 |
| | 8,5 | 470 | 5 +1/2 | 390 | 4 +1/2 | 315 | 3 +1/2 |
| | 9 | 490 | 6 | 410 | 5 | 325 | 4 |
| | 9,5 | 510 | 6 | 425 | 5 | 340 | 4 |
| | 10 | 525 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 |

Urinary S/O es un alimento dietético completo para gatos, formulado específicamente para lograr la disolución de los cálculos de estruvita y evitar su recurrencia gracias a sus propiedades acidificantes de la orina. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de su utilización. Administrar Urinary S/O durante 5-12 semanas para lograr la disolución de los cálculos de estruvita, y hasta 6 meses para reducir su recurrencia. Una vez transcurrido este tiempo, el gato debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario el tratamiento a largo plazo. El gato debe tener agua disponible en todo momento. **NOTA: Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O Feline.**

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y control de recurrencias.
- Urolitos de oxalato de calcio: control de recurrencias.
- Cistitis idiopática felina (CIF).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

- 

CISTITIS IDIOPÁTICA
Gracias al elevado contenido de humedad de los alimentos húmedos, Urinary S/O Feline incrementa la dilución de la orina. Aproximadamente el 64% de las patologías del tracto urinario inferior en gatos (FLUTD, por sus siglas en inglés) son casos de cistitis idiopática; una dieta húmeda debe ser una opción prioritaria en casos de cistitis recurrente.
- 

DISOLUCIÓN DE CÁLCULOS DE ESTRUVITA
Urinary S/O Feline disuelve de forma efectiva los urolitos de estruvita. .
- 

BAJA SOBRESATURACIÓN RELATIVA
Una orina subsaturada es un entorno en el que los cristales no pueden proliferar, por tanto es un medio desfavorable para formación de cristales de estruvita y oxalato de calcio.
- 

DILUCIÓN URINARIA
La dilución de la orina disminuye la concentración urinaria de estruvita y oxalato de calcio. Un mayor volumen urinario también garantiza la limpieza regular de la vejiga.

[S/O® INDEX] Este producto crea un entorno desfavorable para la formación de urolitos de oxalato y de estruvita en la orina.

| VALORES CLAVE | Por 1000 kcal | Por 100g de alimento |
|-------------------------|---------------|----------------------|
| Proteínas | 119,76 g | 10 g |
| Grasas | 41,92 g | 3,5 g |
| Carbohidratos | 44,31 g | 3,7 g |
| Fibra bruta | 11,98 g | 1 g |
| Fibra alimentaria fibre | 14,37 g | 1,2 g |
| Calcio | 2,63 g | 0,22 g |
| Fósforo | 2,28 g | 0,19 g |
| Potasio | 2,16 g | 0,18 g |
| Sodio | 3,59 g | 0,3 g |
| Cloruro | 5,03 g | 0,42 g |
| Magnesio | 0,14 g | 0,01 g |
| Cobre | 4,55 mg | 0,38 mg |
| Zinc | 25,15 mg | 2,10 mg |
| Taurina | 1,2 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 35928,14 UI | 3000 UI |
| Vitamina E | 147,31 mg | 12,30 mg |
| Omega 6 | 8,38 g | 0,7 g |
| Omega 3 | 1,8 g | 0,15 g |
| EPA y DHA | 1,1 g | 0,09 g |
| Energía metabolizable* | 84 | |

*Calculada según NRC 2006.

COMPOSICIÓN
Carnes y subproductos animales, cereales, extractos de proteínas vegetales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, aceites y grasas, azúcares.

ADITIVOS (POR KG)**
Aditivos nutricionales: vitamina D3: 225 UI, E1 (hierro): 3 mg, E2 (yodo): 0,25 mg, E4 (cobre): 2 mg, E5 (manganeso): 1 mg, E6 (zinc): 10 mg - Aditivos tecnológicos: (regulador de acidez) Bisulfato de sodio: 0,5 g.

******Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.

URINARY S/O


MODERATE CALORIE

Disponible en envases de 1,5 kg, 3,5 kg, 7 kg, 9 kg

| CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------|-----------|---------|
| GATO ADULTO | PESO DEL GATO (kg) | CONDICIÓN CORPORAL | | | |
| | | NORMAL | | SOBREPESO | |
| | | gramos | vasos | gramos | vasos |
| | 2 | 36 | 3/8 | 29 | 3/8 |
| | 2,5 | 42 | 4/8 | 34 | 3/8 |
| | 3 | 48 | 5/8 | 39 | 4/8 |
| | 3,5 | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 |
| | 4 | 59 | 6/8 | 47 | 4/8 |
| | 4,5 | 64 | 6/8 | 51 | 5/8 |
| | 5 | 69 | 7/8 | 55 | 5/8 |
| | 5,5 | 74 | 7/8 | 59 | 6/8 |
| | 6 | 79 | 1 | 63 | 6/8 |
| | 6,5 | 84 | 1 | 67 | 6/8 |
| | 7 | 88 | 1 | 70 | 7/8 |
| | 7,5 | 92 | 1 + 1/8 | 74 | 7/8 |
| | 8 | 97 | 1 + 1/8 | 77 | 7/8 |
| | 8,5 | 101 | 1 + 2/8 | 81 | 1 |
| | 9 | 105 | 1 + 2/8 | 84 | 1 |
| | 9,5 | 109 | 1 + 2/8 | 87 | 1 |
| | 10 | 113 | 1 + 3/8 | 91 | 1 + 1/8 |

Urinary S/O Moderate Calorie es un alimento dietético completo para gatos, formulado para disolver los cálculos de estruvita y reducir su recurrencia, gracias a sus propiedades acidificantes de la orina y sus bajos niveles de magnesio. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de su utilización. Administrar Urinary S/O Moderate Calorie durante 5-12 semanas para lograr la disolución de los cálculos de estruvita, y hasta 6 meses para reducir su recurrencia. Una vez transcurrido este tiempo, el gato debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario el tratamiento a largo plazo. El gato debe tener agua disponible en todo momento. **NOTA: Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O Moderate Calorie.**

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR





RECOMENDADO PARA GATOS CON TENDENCIA AL SOBREPESO Y EN CASO DE:


- Urolitos de estruvita: disolución y control de recurrencias.
- Urolitos de oxalato de calcio: control de recurrencias.


NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.

- 

DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver todo tipo de cálculos de estruvita.
- 

APORTE CALÓRICO MODERADO
Contenido calórico moderado para ayudar a mantener el peso ideal.
- 

DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria consigue que la orina sea menos propensa a formar cálculos de estruvita y de oxalato de calcio.
- 

BAJA SOBRESATURACIÓN RELATIVA
Ayuda a reducirla concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales.

[S/O® INDEX] Este producto crea un entorno desfavorable para la formación de urolitos de oxalato y de estruvita en la orina.

| VALORES CLAVE | Por 1000 kcal | Por 100 g de alimento |
|-------------------------|---------------|-----------------------|
| Proteínas | 96,73 g | 34 g |
| Grasas | 31,29 g | 11 g |
| Carbohidratos | 95,87 g | 33,7 g |
| Fibra bruta | 19,91 g | 7 g |
| Fibra alimentaria fibre | 36,98 g | 13 g |
| Calcio | 2,84 g | 1 g |
| Fósforo | 2,56 g | 0,9 g |
| Potasio | 2,84 g | 1 g |
| Sodio | 3,41 g | 1,2 g |
| Cloruro | 6,09 g | 2,14 g |
| Magnesio | 0,17 g | 0,06 g |
| Cobre | 4,27 mg | 1,5 mg |
| Zinc | 48,65 mg | 17,1 mg |
| Taurina | 0,63 g | 0,22 g |
| Vitamina A | 6543,39 UI | 2300 UI |
| Vitamina E | 119,49 mg | 42 mg |
| Omega 6 | 7,28 g | 2,56 g |
| Omega 3 | 1,99 g | 0,7 g |
| EPA y DHA | 0,91 g | 0,32 g |
| Energía metabolizable* | 352 | |

*Calculada según NRC 2006.

COMPOSICIÓN
Arroz, proteínas de ave deshidratadas, gluten de trigo**, harina de maíz, fibras vegetales, gluten de maíz, hidrolizado de proteínas animales, minerales, grasas animales, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).

******L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.

ADITIVOS (POR KG)***
Aditivos nutricionales: vitamina A: 21500 UI, vitamina D3: 800 UI, E1 (hierro): 35 mg, E2 (yodo): 3,5 mg, E4 (cobre): 11 mg, E5 (manganeso): 46 mg, E6 (zinc): 134 mg, E8 (selenio): 0,06 mg - Conservantes - Antioxidantes.

******* Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



URINARY S/O

MODERATE CALORIE



BOCADITOS EN SALSA

Disponible en cajas de 12 sobres de 85 g

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

| GATO ADULTO | PESO DEL GATO (kg) | CONDICIÓN CORPORAL | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|--------|-----------|--------|
| | | NORMAL | | SOBREPESO | |
| | | gramos | sobres | gramos | sobres |
| | 2 | 160 | 2 | 130 | 1 +1/2 |
| | 2,5 | 185 | 2 | 150 | 2 |
| | 3 | 215 | 2 +1/2 | 170 | 2 |
| | 3,5 | 240 | 3 | 190 | 2 |
| | 4 | 260 | 3 | 210 | 2 +1/2 |
| | 4,5 | 285 | 3 +1/2 | 225 | 2 +1/2 |
| | 5 | 305 | 3 +1/2 | 245 | 3 |
| | 5,5 | 330 | 4 | 260 | 3 |
| | 6 | 350 | 4 | 280 | 3 +1/2 |
| | 6,5 | 370 | 4 +1/2 | 295 | 3 +1/2 |
| | 7 | 390 | 4 +1/2 | 310 | 3 +1/2 |
| | 7,5 | 410 | 5 | 325 | 4 |
| | 8 | 430 | 5 | 340 | 4 |
| | 8,5 | 445 | 5 | 355 | 4 |
| | 9 | 465 | 5 +1/2 | 370 | 4 +1/2 |
| | 9,5 | 485 | 5 +1/2 | 385 | 4 +1/2 |
| | 10 | 500 | 6 | 400 | 4 +1/2 |

Urinary S/O Moderate Calorie es un alimento dietético completo para gatos, formulado para disolver los cálculos de estruvita y reducir surecurrencia gracias a sus propiedades acidificantes de la orina y sus bajos niveles de magnesio. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de su utilización. Administrar Urinary S/O Moderate Calorie durante 5-12 semanas para lograr la disolución de los cálculos de estruvita, y hasta 6 meses para reducir su recurrencia. Una vez transcurrido este tiempo, el gato debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario el tratamiento a largo plazo. El gato debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O Moderate Calorie Feline.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA GATOS CON TENDENCIA AL SOBREPESO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y control de recurrencias.
- Urolitos de oxalato de calcio: control de recurrencias.
- Cistitis idiopática felina (CIF).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.



DILUCIÓN URINARIA

La dilución urinaria consigue que la orina sea menos propensa a formar urolitos de estruvita y de oxalato de calcio.



DISOLUCIÓN DE CÁLCULOS DE ESTRUVITA

Ayuda a disolver los urolitos de estruvita.



BAJA SOBRESATURACIÓN RELATIVA

Ayuda a reducirla concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales.



APORTE CALÓRICO MODERADO

Contenido calórico moderado para ayudar a mantener el peso ideal.

[S/O®] Este producto crea un entorno desfavorable para la formación de urolitos de oxalato y de estruvita en la orina.

| VALORES CLAVE | Por 1000 kcal | Por 100 g de alimento |
|-------------------------|---------------|-----------------------|
| Proteínas | 129, 96 g | 9,5 g |
| Grasas | 36,94 g | 2,7 g |
| Carbohidratos | 45,14 g | 3,3 g |
| Fibra bruta | 17,78 g | 1,3 g |
| Fibra alimentaria fibre | 20,52 g | 1,5 g |
| Calcio | 3,01 g | 0,22 g |
| Fósforo | 2,6 g | 0,19 g |
| Potasio | 2,19 g | 0,16 g |
| Sodio | 3,56 g | 0,26 g |
| Cloruro | 4,51 g | 0,33 g |
| Magnesio | 0,14 g | 0,01 g |
| Cobre | 4,92 mg | 0,36 mg |
| Zinc | 24,62 mg | 1,80 mg |
| Taurina | 1,16 g | 0,09 g |
| Vitamina A | 68399,45 UI | 5000 UI |
| Vitamina E | 136 mg | 10 mg |
| Omega 6 | 5,06 g | 0,37 g |
| Omega 3 | 2,33 g | 0,17 g |
| EPA y DHA | 1,09 g | 0,08 g |
| Energía metabolizable* | 73 | |

*Calculada según NRC 2006.

COMPOSICIÓN

Carnes y subproductos animales, pescados y subproductos de pescado, cereales, subproductos de origen vegetal, extractos de proteínas vegetales, sustancias minerales, aceites y grasas, azúcares.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionales: vitamina D3: 170 UI, E1 (hierro): 2 mg, E2 (yodo): 0,25 mg, E4 (cobre): 2 mg, E5 (manganeso): 0,5 mg, E6 (zinc): 5 mg.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.

URINARY S/O



TAMANO DE LA PRODUETA

Disponible en envases de 2 kg, 7,5 kg, 13 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

| PERRO ADULTO | PESO DEL PERRO (kg) | CONDICIÓN CORPORAL | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------------|---------|--------|---------|-----------|---------|
| | | DELGADO | | NORMAL | | SOBREPESO | |
| | | gramos | vasos | gramos | vasos | gramos | vasos |
| | 2 | 54 | 5/8 | 48 | 4/8 | 41 | 4/8 |
| | 4 | 91 | 1 | 80 | 7/8 | 69 | 6/8 |
| | 6 | 123 | 1 + 3/8 | 109 | 1 + 2/8 | 94 | 1 + 1/8 |
| | 8 | 153 | 1 + 6/8 | 135 | 1 + 5/8 | 116 | 1 + 3/8 |
| | 10 | 181 | 2 + 1/8 | 159 | 1 + 7/8 | 138 | 1 + 5/8 |
| | 15 | 245 | 2 + 7/8 | 216 | 2 + 4/8 | 187 | 2 + 1/8 |
| | 20 | 305 | 3 + 4/8 | 268 | 3 + 1/8 | 232 | 2 + 5/8 |
| | 25 | 360 | 4 + 1/8 | 317 | 3 + 5/8 | 274 | 3 + 1/8 |
| | 30 | 413 | 4 + 6/8 | 363 | 4 + 2/8 | 314 | 3 + 5/8 |
| | 35 | 463 | 5 + 3/8 | 408 | 4 + 6/8 | 352 | 4 + 1/8 |
| | 40 | 512 | 5 + 7/8 | 451 | 5 + 2/8 | 389 | 4 + 4/8 |
| | 45 | 560 | 6 + 4/8 | 492 | 5 + 6/8 | 425 | 4 + 7/8 |
| | 50 | 606 | 7 | 533 | 6 + 1/8 | 460 | 5 + 3/8 |
| | 55 | 650 | 7 + 4/8 | 572 | 6 + 5/8 | 494 | 5 + 6/8 |
| | 60 | 694 | 8 | 611 | 7 + 1/8 | 528 | 6 + 1/8 |
| | 70 | 779 | 9 | 686 | 8 | 592 | 6 + 7/8 |
| | 80 | 862 | 10 | 758 | 8 + 6/8 | 655 | 7 + 5/8 |

Urinary S/O es un alimento dietético completo para perros, formulado para disolver los cálculos de estruvita y reducir su recurrencia, gracias a sus propiedades acidificantes en la orina y sus bajos niveles de magnesio. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de su utilización. Administrar Urinary S/O durante 5-12 semanas para lograr la disolución de los cálculos de estruvita, y hasta 6 meses para reducir su recurrencia. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario el tratamiento a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: - Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O canine. - En perros de edad avanzada se recomienda Urinary S/O Ageing*.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y control de recurrencias.
- Urolitos de oxalato de calcio: control de recurrencias.
- Cistitis bacteriana: manejo de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.



DISOLUCIÓN DE CÁLCULOS DE ESTRUVITA

Ayuda a disolver todo tipo de cálculos de estruvita.



BAJA SOBRESATURACIÓN RELATIVA

Ayuda a reducir la concentración de iones que contribuyen a la formación de cristales.



DILUCIÓN URINARIA

La dilución urinaria consigue que la orina sea menos propensa a formar cálculos de estruvita y de oxalato de calcio.



BAJO NIVEL DE MAGNESIO

Nivel reducido de magnesio, un componente natural de los cristales de estruvita.

[S/O®] Este producto crea un entorno desfavorable para la formación de urolitos de oxalato y de estruvita en la orina.

| VALORES CLAVE | Por 1000 kcal | Por 100 g de alimento |
|------------------------|---------------|-----------------------|
| Proteínas | 46,38 g | 18 g |
| Grasas | 43,8 g | 17 g |
| Carbohidratos | 120,85 g | 46,9 g |
| Fibra bruta | 5,67 g | 2,2 g |
| Fibra alimentaria | 14,69 g | 5,7 g |
| Calcio | 1,29 g | 0,5 g |
| Fósforo | 1,29 g | 0,5 g |
| Potasio | 2,06 g | 0,8 g |
| Sodio | 2,83 g | 1,1 g |
| Cloruro | 5,51 g | 2,14 g |
| Magnesio | 0,1 g | 0,04 g |
| Cobre | 3,86 mg | 1,5 mg |
| Zinc | 43,8 mg | 17 mg |
| Taurina | 0,54 g | 0,21 g |
| Vitamina A | 4380,31 UI | 1700 UI |
| Vitamina E | 157,18 mg | 61 mg |
| Omega 6 | 9,25 g | 3,59 g |
| Omega 3 | 1,67 g | 0,63 g |
| EPA y DHA | 0,54 g | 0,21 g |
| Energía metabolizable* | 388 | |

*Calculada según NRC 2006.

COMPOSICIÓN

Harina de maíz, arroz, grasas animales, proteínas de ave deshidratadas, gluten de maíz, minerales, hidrolizado de proteínas animales, fibras vegetales, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, mono y diglicéridos de ácidos palmítico y esteárico esterificados con ácido cítrico, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína). Fuentes de proteína: proteínas de ave deshidratadas, gluten de maíz, hidrolizado de proteínas animales.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionales: vitamina A: 15500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (hierro): 44 mg, E2 (yodo): 4,4 mg, E4 (cobre): 13 mg, E5 (manganeso): 57 mg, E6 (zinc): 147 mg, E8 (selenio): 0,06 mg - Conservantes - Antioxidantes.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.





FINAS LÁMINAS EN SALSA




Disponible en cajas de 12 sobres de **100 g**

| CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------|--------|---------|-----------|---------|
| PERRO ADULTO | PESO DEL PERRO (kg) | CONDICIÓN CORPORAL | | | | | |
| | | DELGADO | | NORMAL | | SOBREPESO | |
| | | gramos | sobres | gramos | sobres | gramos | sobres |
| | 2 | 207 | 2 | 182 | 2 | 157 | 1 +1/2 |
| | 4 | 348 | 3+1/2 | 306 | 3 | 264 | 2 +1/2 |
| | 6 | 471 | 4 +1/2 | 415 | 4 | 358 | 3 +1/2 |
| | 8 | 585 | 6 | 515 | 5 | 444 | 4 +1/2 |
| | 10 | 691 | 7 | 608 | 6 | 525 | 5 +1/2 |
| | 15 | 937 | 9 +1/2 | 824 | 8 | 712 | 7 |
| | 20 | 1162 | 11 +1/2 | 1023 | 10 | 883 | 9 |
| | 25 | 1374 | 13 +1/2 | 1209 | 12 | 1044 | 10 +1/2 |
| | 30 | 1576 | 16 | 1386 | 14 | 1197 | 12 |
| | 35 | 1769 | 17 +1/2 | 1556 | 15 +1/2 | 1344 | 13 +1/2 |
| | 40 | 1955 | 19 +1/2 | 1720 | 17 | 1486 | 15 |

Urinary S/O es un alimento dietético completo para perros, formulado para disolver los cálculos de estruvita y reducir su recurrencia, gracias a sus propiedades acidificantes de la orina y sus bajos niveles de magnesio. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de su utilización. Admistrar Urinary S/O durante 5-12 semanas para lograr la disolución de los cálculos de estruvita, y hasta 6 meses para reducir su recurrencia. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario el tratamiento a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: - Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O. - En perros de edad avanzada se recomienda Urinary S/O Ageing®.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR




RECOMENDADO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y control de recurrencias.
- Urolitos de oxalato de calcio: control de recurrencias.
- Cistitis bacteriana: manejo de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).


NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.




DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA

Ayuda a disolver todo tipo de cálculos de estruvita.



DILUCIÓN URINARIA

La dilución urinaria consigue que la orina sea menos propensa a formar cálculos de estruvita y de oxalato de calcio.



BAJASOBRESATURACIÓN RELATIVA

Ayuda a reducir la concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales.

[S/O® INDEX] Este producto crea un entorno desfavorable para la aparición de urolitos de oxalato y de estruvita en la orina.

| VALORES CLAVE | Por 1000 kcal | Por 100 g de alimento |
|------------------------|---------------|-----------------------|
| Proteínas | 86,11 g | 8 g |
| Grasas | 59,2 g | 5,5 g |
| Carbohidratos | 51,67 g | 4,8 g |
| Fibra bruta | 12,92 g | 1,2 g |
| Fibra alimentaria | 15,07 g | 1,4 g |
| Calcio | 1,61 g | 0,15 g |
| Fósforo | 1,51 g | 0,14 g |
| Potasio | 1,61 g | 0,15 g |
| Sodio | 2,91 g | 0,27 g |
| Cloruro | 3,98 g | 0,37 g |
| Magnesio | 0,13 g | 0,01 g |
| Cobre | 3,77 mg | 0,35 mg |
| Zinc | 23,14 mg | 2,15 mg |
| Taurina | 1,24 g | 0,12 g |
| Vitamina A | 46286,33 UI | 4300 UI |
| Vitamina E | 226,05 mg | 21 mg |
| Omega 6 | 19,38 g | 1,8 g |
| Omega 3 | 1,35 g | 0,13 g |
| EPA y DHA | 0,65 | 0,06 g |
| Energía metabolizable* | 93 | |

*Calculada según NRC 2006.

COMPOSICIÓN
Carnes y subproductos animales, cereales, aceites y grasas, extractos de proteínas vegetales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, azúcares.

ADITIVOS (POR KG)**
Aditivos nutricionales: vitamina D3: 210 UI, E1 (hierro): 3,5 mg, E2 (yodo): 0,25 mg, E4 (cobre): 2 mg, E5 (manganeso): 1,1 mg, E6 (zinc): 11 mg - Aditivos tecnológicos: (regulador de acidez) Bisulfato de sodio: 1,107 g.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.

URINARY S/O



PATÉ




Disponible en latas de **200 g, 410 g**

| CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------|--------|---------|-----------|---------|
| PERRO ADULTO | PESO DEL PERRO (kg) | CONDICIÓN CORPORAL | | | | | |
| | | DELGADO | | NORMAL | | SOBREPESO | |
| | | gramos | latas | gramos | latas | gramos | latas |
| | 2 | 208 | 2/4 | 183 | 2/4 | 158 | 2/4 |
| | 4 | 350 | 3/4 | 308 | 3/4 | 266 | 3/4 |
| | 6 | 475 | 1 + 1/4 | 418 | 1 | 361 | 1 |
| | 8 | 589 | 1 + 2/4 | 519 | 1 + 1/4 | 448 | 1 |
| | 10 | 697 | 1 + 3/4 | 613 | 1 + 2/4 | 529 | 1 + 1/4 |
| | 15 | 944 | 2 + 1/4 | 831 | 2 | 718 | 1 + 3/4 |
| | 20 | 1172 | 1 + 3/4 | 1031 | 2 + 2/4 | 890 | 2 + 1/4 |
| | 25 | 1385 | 3 + 2/4 | 1219 | 3 | 1053 | 2 + 2/4 |
| | 30 | 1588 | 3 + 3/4 | 1397 | 3 + 2/4 | 1207 | 3 |
| | 35 | 1783 | 4 + 1/4 | 1569 | 3 + 3/4 | 1355 | 3 + 1/4 |
| | 40 | 1970 | 4 + 3/4 | 1734 | 4 + 1/4 | 1498 | 3 + 3/4 |
| | 45 | 2152 | 5 + 1/4 | 1894 | 4 + 2/4 | 1636 | 4 |
| | 50 | 2329 | 5 + 3/4 | 2050 | 5 | 1770 | 4 + 1/4 |
| | 55 | 2502 | 6 | 2202 | 5 + 1/4 | 1902 | 4 + 3/4 |
| | 60 | 2671 | 6 + 2/4 | 2350 | 5 + 3/4 | 2030 | 5 |
| | 70 | 2998 | 7 + 1/4 | 2638 | 6 + 2/4 | 2279 | 5 + 2/4 |
| | 80 | 3314 | 8 | 2916 | 7 | 2519 | 6 + 1/4 |

Urinary S/O es un alimento dietético para perros, formulado para disolver los cálculos de estruvita y reducir su recurrencia, gracias a sus propiedades acidificantes de la orina y sus bajos niveles de magnesio. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de su utilización. Administrar Urinary S/O durante 5-12 semanas para lograr la disolución de los cálculos de estruvita, y hasta 6 meses para reducir su recurrencia. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario el tratamiento a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento. NOTA: Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O. En perros de edad avanzada se recomienda Urinary S/O Ageing®.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR




RECOMENDADO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y control de recurrencias.
- Urolitos de oxalato de calcio: control de recurrencias.
- Cistitis bacteriana: manejo de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).


NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.




DISOLUCIÓN DE ESTRUVITA

Ayuda a disolver todo tipo de cálculos de estruvita.



DILUCIÓN URINARIA

La dilución urinaria consigue que la orina sea menos propensa a formar cálculos de estruvita y de oxalato de calcio.



BAJA SOBRESATURACIÓN RELATIVA

Ayuda a reducir la concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales.

[S/O® INDEX] Este producto crea un entorno desfavorable para la formación de urolitos de oxalato y de estruvita en la orina.

| VALORES CLAVE | Por 1000 kcal | Por 100g de alimento |
|------------------------|---------------|----------------------|
| Proteínas | 83,68 g | 8 g |
| Grasas | 62,76 g | 6 g |
| Carbohidratos | 48,12 g | 4,6 g |
| Fibra bruta | 14,64 g | 1,4 g |
| Fibra alimentaria | 25,1 g | 2,4 g |
| Calcio | 2,2 g | 0,21 g |
| Fósforo | 2,09 g | 0,2 g |
| Potasio | 2,09 g | 0,2 g |
| Sodio | 3,03 g | 0,29 g |
| Cloruro | 4,18 g | 0,4 g |
| Magnesio | 0,17 g | 0,02 g |
| Cobre | 3,14 mg | 0,3 mg |
| Zinc | 23,01 mg | 2,2 mg |
| Taurina | 1,26 g | 0,12 g |
| Vitamina A | 47071,13 UI | 4500 UI |
| Vitamina E | 198,74 mg | 19 mg |
| Omega 6 | 25,1 g | 2,4 g |
| Omega 3 | 1,36 g | 0,13 g |
| EPA y DHA | 0,63 g | 0,06 g |
| Energía metabolizable* | 96 | |

*Calculada según NRC 2006.

COMPOSICIÓN
Carnes y subproductos animales, aceites y grasas, cereales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, azúcares. ADITIVOS (POR KG)**
Aditivos nutricionales: vitamina D3: 190 UI, E1 (hierro): 3,4 mg, E2 (yodo): 0,24 mg, E4 (cobre): 2 mg, E5 (manganeso): 1 mg, E6 (zinc): 10 mg - Aditivos tecnológicos: bisulfato de sodio: 0,56 g.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.



URINARY S/O

MODERATE CALORIE



Disponible en envases de 1,5 kg, 6,5 kg, 12 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

| PESO DEL PERRO (kg) | CONDICIÓN CORPORAL | | | |
|---------------------|--------------------|---------|-----------|---------|
| | NORMAL | | SOBREPESO | |
| | gramos | vasos | gramos | vasos |
| 2 | 49 | 5/8 | 41 | 4/8 |
| 4 | 82 | 1 | 69 | 7/8 |
| 6 | 111 | 1 + 3/8 | 93 | 1 + 1/8 |
| 8 | 137 | 1 + 6/8 | 116 | 1 + 4/8 |
| 10 | 163 | 2 | 137 | 1 + 6/8 |
| 15 | 220 | 2 + 6/8 | 186 | 2 + 3/8 |
| 20 | 273 | 3 + 4/8 | 230 | 2 + 7/8 |
| 25 | 323 | 4 + 1/8 | 272 | 3 + 3/8 |
| 30 | 370 | 4 + 5/8 | 312 | 4 |
| 35 | 416 | 5 + 2/8 | 350 | 4 + 3/8 |
| 40 | 460 | 5 + 6/8 | 387 | 4 + 7/8 |
| 45 | 502 | 6 + 3/8 | 423 | 5 + 3/8 |
| 50 | 543 | 6 + 7/8 | 458 | 5 + 6/8 |
| 55 | 584 | 7 + 3/8 | 492 | 6 + 2/8 |
| 60 | 623 | 7 + 7/8 | 525 | 6 + 5/8 |
| 65 | 662 | 8 + 3/8 | 557 | 7 |
| 70 | 699 | 8 + 7/8 | 589 | 7 + 3/8 |

Urinary S/O Moderate Calorie es un alimento dietético completo para perros, formulado para disolver los cálculos de estruvita y reducir su recurrencia, gracias a sus propiedades acidificantes de la orina y sus bajos niveles de magnesio. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de su utilización. Administrar Urinary S/O Moderate Calorie durante 5-12 semanas para lograr la disolución de los cálculos de estruvita, y hasta 6 meses para reducir su recurrencia. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario el tratamiento a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: - Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O Moderate Calorie Canine. - Se recomienda dividir la ración diaria en 2 tomas.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA PERROS CON TENDENCIA AL SOBREPESO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y control de recurrencias.
- Urolitos de oxalato de calcio: control de recurrencias.
- Cistitis bacteriana: gestión de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.



DISOLUCIÓN DE CÁLCULOS DE ESTRUVITA

Ayuda a disolver todo tipo de cálculos de estruvita.



APORTE CALÓRICO MODERADO

Su contenido calórico moderado ayuda a mantener el peso ideal.



DILUCIÓN URINARIA

La dilución urinaria consigue que la orina sea menos propensa a formar cálculos de estruvita y de oxalato de calcio.



BAJA SOBRESATURACIÓN RELATIVA

Ayuda a reducirla concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales de estruvita y de oxalato de calcio.

[S/O] INDEX Este producto crea un entorno desfavorable para la formación de urolitos de oxalato y de estruvita en la orina.

VALORES CLAVE

| | Por 1000 kcal | Por 100 g de alimento |
|-------------------|---------------|-----------------------|
| Proteínas | 60,85 g | 20 g |
| Grasas | 33,47 g | 11 g |
| Carbohidratos | 139,34 g | 45,8 g |
| Fibra bruta | 19,77 g | 6,5 g |
| Fibra alimentaria | 37,12 g | 12,2 g |
| Calcio | 1,73 g | 0,57 g |
| Fósforo | 1,73 g | 0,57 g |
| Potasio | 2,43 g | 0,8 g |
| Sodio | 3,65 g | 1,2 g |
| Cloruro | 6,54 g | 2,15 g |
| Magnesio | 0,18 g | 0,06 g |
| Cobre | 4,56 mg | 1,5 mg |
| Zinc | 51,72 mg | 17 mg |
| Taurina | 0,52 g | 0,17 g |
| Vitamina A | 6997,26 UI | 2300 UI |
| Vitamina E | 136,9 mg | 45 mg |
| Omega 6 | 7,18 g | 2,36g |
| Omega 3 | 1,52 g | 0,5 g |
| EPA y DHA | 0,61 g | 0,2 g |

Energía metabolizable* 329

*Calculada según NRC 2006.

COMPOSICIÓN

Harina de maíz, arroz, proteínas de ave deshidratadas, fibras vegetales, gluten de maíz, grasas animales, minerales, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de achicoria, gluten de trigo**, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, mono y diglicéridos de ácidos palmítico y esteárico esterificados con ácido cítrico, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína). Fuentes de proteína: proteínas de ave deshidratadas, gluten de maíz, hidrolizado de proteínas animales, gluten de trigo.

**L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutricionales: vitamina A: 21500 UI, vitamina D3: 1400 UI, E1 (hierro): 44 mg, E2 (yodo): 4,4 mg, E4 (cobre): 14 mg, E5 (manganeso): 58 mg, E6 (zinc): 146 mg, E8 (selenio): 0,11 mg - Conservantes - Antioxidantes.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.

URINARY S/O

MODERATE CALORIE



Disponible en cajas de 12 sobres 100 g

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

| PESO DEL PERRO (kg) | CONDICIÓN CORPORAL | | | |
|---------------------|--------------------|----------|-----------|----------|
| | NORMAL | | SOBREPESO | |
| | gramos | sobres | gramos | sobres |
| 2 | 181 | 2 | 152 | 1 + 1/2 |
| 4 | 304 | 3 | 256 | 2 + 1/2 |
| 6 | 412 | 4 | 347 | 3 + 1/2 |
| 8 | 512 | 5 | 431 | 4 + 1/2 |
| 10 | 605 | 6 | 509 | 5 |
| 15 | 820 | 8 | 691 | 7 |
| 20 | 1018 | 10 | 857 | 8 + 1/2 |
| 25 | 1203 | 12 | 1013 | 10 |
| 30 | 1379 | 14 | 1161 | 11 + 1/2 |
| 35 | 1548 | 15 + 1/2 | 1304 | 13 |
| 40 | 1711 | 17 | 1441 | 14 + 1/2 |

Urinary S/O es un alimento dietético completo para perros, formulado para disolver los cálculos de estruvita y reducir su recurrencia, gracias a sus propiedades acidificantes de la orina y sus bajos niveles de magnesio. RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de su utilización. Administrar Urinary S/O Moderate Calorie durante 5-12 semanas para lograr la disolución de los cálculos de estruvita, y hasta 6 meses para reducir su recurrencia. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario el tratamiento a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: - Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O Moderate Calorie.

- Se recomienda distribuir la ingesta ración diaria en 2 tomas.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR



RECOMENDADO PARA PERROS CON TENDENCIA A SOBREPESO EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y control de recurrencias.
- Urolitos de oxalato de calcio: control de recurrencias.
- Cistitis bacteriana: manejo de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.



DISOLUCIÓN DE CÁLCULOS DE ESTRUVITA

Ayuda a disolver todo tipo de cálculos de estruvita.



APORTE CALÓRICO MODERADO

Contenido calórico moderado para ayudar a mantener el peso ideal.



DILUCIÓN URINARIA

La dilución urinaria consigue que la orina sea menos propensa a formar cálculos de estruvita y de oxalato de calcio.



BAJA SOBRESATURACIÓN RELATIVA

Ayuda a reducir la concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales.

[S/O] INDEX Este producto crea un entorno desfavorable para la formación de urolitos de oxalato y de estruvita en la orina.

VALORES CLAVE

| | Por 1000 kcal | Por 100 g de alimento |
|-------------------|---------------|-----------------------|
| Proteínas | 97,32 g | 8 g |
| Grasas | 43,8 g | 3,6 g |
| Carbohidratos | 71,78 g | 5,9 g |
| Fibra bruta | 12,17 g | 1 g |
| Fibra alimentaria | 17,64 g | 1,5 g |
| Calcio | 1,7 g | 0,14 g |
| Fósforo | 1,58 g | 0,13 g |
| Potasio | 1,82 g | 0,15 g |
| Sodio | 2,92 g | 0,24 g |
| Cloruro | 4,26 g | 0,35 g |
| Magnesio | 0,12 g | 0,01 g |
| Cobre | 3,65 mg | 0,30 mg |
| Zinc | 21,29 mg | 1,75 mg |
| Taurina | 1,22 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 48661,8 UI | 4000 UI |
| Vitamina E | 182,48 mg | 15 mg |
| Omega 6 | 973 g | 0,80 g |
| Omega 3 | 1,34 g | 0,11 g |
| EPA y DHA | 0,61 g | 0,05 g |

Energía metabolizable* 82

*Calculada según NRC 2006.

COMPOSICIÓN

Carnes y subproductos animales, cereales, extractos de proteínas vegetales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, aceites y grasas, azúcares.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionales: vitamina D3: 180 UI, E1 (hierro): 2 mg, E2 (yodo): 0,2 mg, E4 (cobre): 1,8 mg, E5 (manganeso): 0,8 mg, E6 (zinc): 8 mg - Aditivos tecnológicos: (regulador de acidez) Bisulfato de sodio: 1,1 g.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.





Disponible en envases de 1,5 kg, 3,5 kg, 8 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

| | PESO DEL PERRO (kg) | CONDICIÓN CORPORAL | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------------|---------|--------|---------|-----------|---------|
| | | DELGADO | | NORMAL | | SOBREPESO | |
| | | gramos | vasos | gramos | vasos | gramos | vasos |
| PERRO ADULTO | 2 | 55 | 5/8 | 48 | 4/8 | 42 | 4/8 |
| | 4 | 92 | 1 | 81 | 7/8 | 70 | 6/8 |
| | 6 | 125 | 1 + 3/8 | 110 | 1 + 2/8 | 95 | 1 |
| | 8 | 155 | 1 + 6/8 | 136 | 1 + 4/8 | 117 | 1 + 2/8 |
| | 10 | 183 | 2 | 161 | 1 + 6/8 | 139 | 1 + 4/8 |
| | 15 | 248 | 2 + 6/8 | 218 | 2 + 3/8 | 188 | 2 |
| | 20 | 307 | 3 + 3/8 | 270 | 3 | 233 | 2 + 4/8 |
| | 25 | 363 | 4 | 320 | 3 + 4/8 | 276 | 3 |
| | 30 | 416 | 4 + 4/8 | 366 | 4 | 316 | 3 + 4/8 |
| | 35 | 467 | 5 + 1/8 | 411 | 4 + 4/8 | 355 | 3 + 7/8 |
| | 40 | 517 | 5 + 5/8 | 455 | 5 | 393 | 4 + 2/8 |
| | 45 | 564 | 6 + 1/8 | 497 | 5 + 4/8 | 429 | 4 + 6/8 |
| | 50 | 611 | 6 + 6/8 | 538 | 5 + 7/8 | 464 | 5 + 1/8 |
| | 55 | 656 | 7 + 2/8 | 577 | 6 + 3/8 | 499 | 5 + 4/8 |
| | 60 | 700 | 7 + 5/8 | 616 | 6 + 6/8 | 532 | 5 + 7/8 |
| | 70 | 786 | 8 + 5/8 | 692 | 7 + 5/8 | 597 | 6 + 4/8 |
| | 80 | 869 | 9 + 4/8 | 765 | 8 + 3/8 | 660 | 7 + 2/8 |

Urinary S/O Ageing[®] es un alimento dietético completo para perros, formulado para disolver los cálculos de estruvita y reducir su recurrencia, gracias a sus propiedades acidificantes de la orina y sus bajos niveles de magnesio.

RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de su suministro. Administrar Urinary S/O Ageing[®] durante 5-12 semanas para lograr la disolución de los cálculos de estruvita, y hasta 6 meses para reducir su recurrencia. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario el tratamiento a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR



RECOMENDADOPARA PERROS DE EDAD AVANZADA (>7 AÑOS) EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y control de recurrencias.
- Urolitos de oxalato de calcio: control de recurrencias.
- Cistitis bacteriana: manejo de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Hiperkalemia.
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.



SALUD DEL TRACTO URINARIO

Eficaz disolución de los cálculos de estruvita y formulado específicamente para diluir hasta el 90% de todos los cálculos urinarios.



SOPORTE PARA EL ENVEJECIMIENTO

Favorece la vitalidad y la función cognitiva de los perros con una mezcla exclusiva de nutrientes y antioxidantes. También favorece la salud renal.



Este producto crea un entorno desfavorable para la aparición de urolitos de oxalato y de estruvita en la orina.

| VALORES CLAVE | Por 1000 kcal | Por 100 g de alimento |
|------------------------|---------------|-----------------------|
| Proteínas | 24,69 g | 20 g |
| Grasas | 44,18 g | 17 g |
| Carbohidratos | 114,35 g | 44 g |
| Fibra bruta | 6,24 g | 2,4 g |
| Fibra alimentaria | 14,81 g | 5,7 g |
| Calcio | 1,74 g | 0,67 g |
| Fósforo | 1,46 g | 0,56 g |
| Potasio | 4,55 g | 1,75 g |
| Sodio | 1,04 g | 0,4 g |
| Cloruro | 3,82 g | 1,47 g |
| Magnesio | 0,23 g | 0,09 g |
| Cobre | 3,9 mg | 1,5 mg |
| Zinc | 44,18 mg | 17 mg |
| Taurina | 0,49 g | 0,19 g |
| Vitamina A | 4417,88 UI | 1700 UI |
| Vitamina E | 124,74 mg | 48 mg |
| Omega 6 | 8,97 g | 3,45 g |
| Omega 3 | 2,39 g | 0,92 g |
| EPA y DHA | 1,04 g | 0,4 g |
| Energía metabolizable* | 385 | |

*Cálculos realizados según el NRC del 2006.

COMPOSICIÓN

Arroz, harina de maíz, proteínas de ave deshidratadas, grasas animales, harina de trigo, minerales, hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, celulosa en polvo, gluten de trigo**, huevo deshidratado, aceite de pescado, aceite de soja, pulpa de tomate deshidratada (fuente de licopeno), fructo-oligosacáridos, hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartilago (fuente de condroitina). Fuentes de proteína: proteínas de ave deshidratadas, hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, gluten de trigo, huevo deshidratado.

**L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutricionales: vitamina A: 15500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (hierro): 60 mg, E2 (yodo): 5,3 mg, E4 (cobre): 14 mg, E5 (manganeso): 67 mg, E6 (zinc): 145 mg, E8 (selenio): 0,11 mg - Aditivos tecnológicos: Bisulfato de sodio [sustancia acidificante de la orina]: 5 g - Conservantes – Antioxidantes.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.

URINARY S/O AGEING 7+



Disponible en cajas de 12 sobres de 85 g

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

| | PESO DEL PERRO (kg) | CONDICIÓN CORPORAL | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------------|----------|--------|---------|-----------|----------|
| | | DELGADO | | NORMAL | | SOBREPESO | |
| | | gramos | sobres | gramos | sobres | gramos | sobres |
| PERRO ADULTO | 2 | 203 | 2 + 1/2 | 178 | 2 | 154 | 2 |
| | 4 | 341 | 4 | 300 | 3 + 1/2 | 259 | 3 |
| | 6 | 462 | 5 + 1/2 | 406 | 5 | 351 | 4 |
| | 8 | 573 | 6 + 1/2 | 504 | 6 | 435 | 5 |
| | 10 | 677 | 8 | 596 | 7 | 515 | 6 |
| | 15 | 918 | 11 | 808 | 9 + 1/2 | 698 | 8 |
| | 20 | 1139 | 13 + 1/2 | 1002 | 12 | 866 | 10 |
| | 25 | 1346 | 16 | 1185 | 14 | 1023 | 12 |
| | 30 | 1544 | 18 | 1358 | 16 | 1173 | 14 |
| | 35 | 1733 | 20 + 1/2 | 1525 | 18 | 1317 | 15 + 1/2 |
| | 40 | 1915 | 22 + 1/2 | 1686 | 20 | 1456 | 17 |

Urinary S/O Ageing[®] es un alimento dietético completo para perros, formulado para disolver los cálculos de estruvita y reducir su recurrencia, gracias a sus propiedades acidificantes de la orina y sus bajos niveles de magnesio.

RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de su utilización. Administrar Urinary S/O[®] durante 5-12 semanas para lograr la disolución de los cálculos de estruvita, y hasta 6 meses para reducir su recurrencia. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario el tratamiento a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR



RECOMENDADOPARA PERROS DE EDAD AVANZADA (>7 AÑOS) EN CASO DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y control de recurrencias.
- Urolitos de oxalato de calcio: control de recurrencias.
- Cistitis bacteriana: manejo de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Hiperkalemia.
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.



SALUD DEL TRACTO URINARIO

Eficaz disolución de los cálculos de estruvita y formulado específicamente para hasta el 80% de todos los cálculos urinarios.



SOPORTE PARA EL ENVEJECIMIENTO

Favorece la vitalidad y la función cognitiva de los perros con una mezcla exclusiva de nutrientes y antioxidantes. También favorece la salud renal.



Este producto crea un entorno desfavorable para la formación de urolitos de oxalato y de estruvita en la orina.

| VALORES CLAVE | Por 1000 kcal | Por 100 g de alimento |
|------------------------|---------------|-----------------------|
| Proteínas | 91,68 g | 8,7 g |
| Grasas | 62,17 g | 5,9 g |
| Carbohidratos | 44,26 g | 4,2 g |
| Fibra bruta | 17,91 g | 1,7 g |
| Fibra alimentaria | 23,18 g | 2,2 g |
| Calcio | 2 g | 0,19 g |
| Fósforo | 1,48 g | 0,14 g |
| Potasio | 4,43 g | 0,42 g |
| Sodio | 1,05 g | 0,1 g |
| Cloruro | 4,21 g | 0,4 g |
| Magnesio | 0,14 g | 0,01 g |
| Cobre | 3,16 mg | 0,3 mg |
| Zinc | 27,4 mg | 2,6 mg |
| Taurina | 1,29 g | 0.12 g |
| Vitamina A | 50579,56 UI | 4800 UI |
| Vitamina E | 221,29 mg | 21 mg |
| Omega 6 | 20,02 g | 1,9 g |
| Omega 3 | 1,9 g | 0,18 g |
| EPA y DHA | 1,05 g | 0,1 g |
| Energía metabolizable* | 95 | |

*Calculada según NRC 2006.

COMPOSICIÓN

carnes y subproductos animales, subproductos de origen vegetal, cereales, aceites y grasas, sustancias minerales, azúcares, verduras.

ADITIVOS (POR KG)**

Aditivos nutricionales: vitamina D3: 210 UI, E1 (hierro): 4 mg, E2 (yodo): 0,2 mg, E4 (cobre): 1,5 mg, E5 (manganeso): 1,3 mg, E6 (zinc): 13 mg.

**Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.





URINARY S/O

SMALL DOGS



Disponible en envases de 1,5 kg, 4 kg, 8 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

| | PESO DEL PERRO (kg) | CONDICIÓN CORPORAL | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------------|---------|--------|---------|-----------|---------|
| | | DELGADO | | NORMAL | | SOBREPESO | |
| | | gramos | vasos | gramos | vasos | gramos | vasos |
| PERRO ADULTO | 2 | 55 | 5/8 | 48 | 4/8 | 42 | 4/8 |
| | 2,5 | 65 | 5/8 | 57 | 5/8 | 49 | 4/8 |
| | 3 | 74 | 6/8 | 65 | 5/8 | 56 | 5/8 |
| | 3,5 | 83 | 7/8 | 73 | 6/8 | 63 | 5/8 |
| | 4 | 92 | 1 | 81 | 7/8 | 70 | 6/8 |
| | 5 | 109 | 1 + 1/8 | 96 | 1 | 83 | 7/8 |
| | 6 | 125 | 1 + 2/8 | 110 | 1 + 1/8 | 95 | 1 |
| | 7 | 140 | 1 + 4/8 | 123 | 1 + 2/8 | 106 | 1 + 1/8 |
| | 8 | 155 | 1 + 5/8 | 136 | 1 + 3/8 | 117 | 1 + 2/8 |
| | 9 | 169 | 1 + 6/8 | 149 | 1 + 4/8 | 128 | 1 + 3/8 |
| | 10 | 183 | 1 + 7/8 | 161 | 1 + 5/8 | 139 | 1 + 4/8 |

Urinary S/O Small Dog es un alimento dietético completo para perros, formulado para disolver los cálculos de estruvita y reducir su recurrencia, gracias a sus propiedades acidificantes de la orina y sus bajos niveles de magnesio.

RECOMENDACIONES: Se recomienda consultar a un veterinario antes de su utilización. Administrar Urinary S/O Small Dog durante 5-12 semanas para lograr la disolución de los cálculos de estruvita, y hasta 6 meses para reducir su recurrencia. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario el tratamiento a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

NOTA: - Se recomienda valorar la función renal antes de utilizar Urinary S/O Small Dog.

- En perros de edad avanzada se recomienda Urinary S/O Ageing®.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR



RECOMENDADO EN CASOS DE:

- Urolitos de estruvita: disolución y control de recurrencias.
- Urolitos de oxalato de calcio: control de la recurrencia.
- Cistitis bacteriana: gestión de cristaluria de estruvita secundaria (combinado con la antibioterapia adecuada).

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Enfermedades cardíacas (en casos de restricción de sodio).
- Uso concurrente de medicamentos acidificantes urinarios.
- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.



DISOLUCIÓN DE CÁLCULOS DE ESTRUVITA
Ayuda a disolver todo tipo de cálculos de estruvita.



BAJA SOBRESATURACIÓN RELATIVA
Ayuda a reducirla concentración de los iones que contribuyen a la formación de cristales.



DILUCIÓN URINARIA
La dilución urinaria consigue que la orina sea menos propensa a formar cálculos de estruvita y de oxalato de calcio.



CONTROL DEL SARRO
Nutrientes capaces de captar el calcio de la saliva para reducir la acumulación de sarro.

[S/O® INDEX] Este producto crea un entorno desfavorable para la formación de urolitos de oxalato y de estruvita en la orina.

| VALORES CLAVE | Por 1000 kcal | Por 100 g de alimento |
|------------------------|---------------|-----------------------|
| Proteínas | 51,98 g | 20 g |
| Grasas | 44,18 g | 17 g |
| Carbohidratos | 114,09 g | 43,9 g |
| Fibra bruta | 5,98 g | 2,3 g |
| Fibra alimentaria | 14,55 g | 5,6 g |
| Calcio | 1,85 g | 0,71 g |
| Fósforo | 1,82 g | 0,7 g |
| Potasio | 2,08 g | 0,8 g |
| Sodio | 3,12 g | 1,2 g |
| Cloruro | 5,2 g | 2 g |
| Magnesio | 0,13 g | 0,05 g |
| Cobre | 3,9 mg | 1,5 mg |
| Zinc | 44,18 mg | 17 mg |
| Taurina | 0,49 g | 0,19 g |
| Vitamina A | 4547,82 IU | 1750 IU |
| Vitamina E | 124,74 mg | 48 mg |
| Omega 6 | 9,3 g | 3,58 g |
| Omega 3 | 1,72 g | 0,66 g |
| EPA y DHA | 0,57 g | 0,22 g |
| Energía metabolizable* | 385 | |

*Calculada según NRC 2006.

COMPOSICIÓN

Arroz, harina de maíz, proteínas de ave deshidratadas, grasas animales, gluten de maíz, hidrolizado de proteínas animales, minerales, fibras vegetales, huevo deshidratado, gluten de trigo**, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína). Fuentes de proteína: proteínas de ave deshidratadas, gluten de maíz, hidrolizado de proteínas animales, huevo deshidratado, gluten de trigo.

**L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutricionales: vitamina A: 16000 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (hierro): 47 mg, E2 (yodo): 4,7 mg, E4 (cobre): 14 mg, E5 (manganeso): 61 mg, E6 (zinc): 148 mg, E8 (selenio): 0,06 mg - Aditivos tecnológicos: Trifosfato pentasódico: 3,5 g - Conservantes - Antioxidantes.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.

URINARY U/C



Disponible en envases de 2 kg, 7,5 kg, 14 kg

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

| | PESO DEL PERRO (kg) | CONDICIÓN CORPORAL | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------------|---------|--------|---------|-----------|---------|
| | | DELGADO | | NORMAL | | SOBREPESO | |
| | | gramos | vasos | gramos | vasos | gramos | vasos |
| PERRO ADULTO | 2 | 55 | 5/8 | 48 | 4/8 | 42 | 4/8 |
| | 4 | 92 | 1 | 81 | 7/8 | 70 | 6/8 |
| | 6 | 125 | 1 + 3/8 | 110 | 1 + 2/8 | 95 | 1 |
| | 8 | 155 | 1 + 6/8 | 137 | 1 + 4/8 | 118 | 1 + 2/8 |
| | 10 | 184 | 2 | 162 | 1 + 6/8 | 140 | 1 + 4/8 |
| | 15 | 249 | 2 + 6/8 | 219 | 2 + 3/8 | 189 | 2 + 1/8 |
| | 20 | 309 | 3 + 3/8 | 272 | 3 | 235 | 2 + 5/8 |
| | 25 | 365 | 4 | 321 | 3 + 4/8 | 278 | 3 |
| | 30 | 419 | 4 + 5/8 | 368 | 4 | 318 | 3 + 4/8 |
| | 35 | 470 | 5 + 1/8 | 414 | 4 + 4/8 | 357 | 3 + 7/8 |
| | 40 | 520 | 5 + 6/8 | 457 | 5 | 395 | 4 + 3/8 |
| | 45 | 568 | 6 + 2/8 | 499 | 5 + 4/8 | 431 | 4 + 6/8 |
| | 50 | 614 | 6 + 6/8 | 541 | 5 + 7/8 | 467 | 5 + 1/8 |
| | 55 | 660 | 7 + 2/8 | 581 | 6 + 3/8 | 501 | 5 + 4/8 |
| | 60 | 704 | 7 + 6/8 | 620 | 6 + 6/8 | 535 | 5 + 7/8 |
| | 70 | 791 | 8 + 5/8 | 696 | 7 + 5/8 | 601 | 6 + 5/8 |
| | 80 | 874 | 9 + 5/8 | 769 | 8 + 3/8 | 664 | 7 + 2/8 |

Urinary U/C es un alimento dietético completo para perros, formulado específicamente para lograr la reducción de la formación de cálculos de urato y cistina, gracias a su bajo contenido de proteínas y purinas, sus proteínas de alta calidad, su nivel moderado de aminoácidos azufrados y sus propiedades alcalinizantes.

RECOMENDACIONES: Administrar Urinary U/C durante un máximo de 6 meses para reducir la formación de cálculos de urato, hasta 1 año para reducir la formación de cálculos de cistina y de por vida en caso de una alteración irreversible del metabolismo del ácido úrico. Se recomienda consultar a un veterinario antes de su utilización o prolongar su consumo. Una vez transcurrido este tiempo, el perro debe ser evaluado con regularidad por un veterinario para valorar si es necesario el tratamiento a largo plazo. El perro debe tener agua disponible en todo momento.

ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR



RECOMENDADO EN CASO DE:

- Urolitos metabólicos (urato, xantina, cistina): control de la recurrencia.
- Hiperuricosuria.
- Control del riesgo de formación de urolitos metabólicos en perros con leishmaniosis tratados con inhibidores de la xantina oxidasa, por ejemplo con Allopurinol. Si presentan enfermedad renal secundaria (nefropatía con pérdida de proteínas con o sin azotemia), se recomienda cambiar a una dieta Renal.

NO RECOMENDADO EN CASO DE:

- Fases de crecimiento, gestación y lactancia.



CONTROL DE URATO
Una selección de proteínas de bajo contenido en purinas ayuda a reducir la formación de cálculos urinarios de urato.



CONTROL DE CISTINA
Ayuda a reducir proteínas y algunos aminoácidos ayuda a limitar la formación de cálculos urinarios de cistina.



BARRERA CUTÁNEA
Un complejo para favorecer el efecto barrera de la piel.



COMPLEJO ANTIOXIDANTE
Un complejo sinérgico de antioxidantes que ayuda a neutralizar los radicales libres.

| VALORES CLAVE | Por 1000 kcal | Por100 g de alimento |
|------------------------|---------------|----------------------|
| Proteínas | 47,03 g | 18 g |
| Grasas | 39,2 g | 15 g |
| Carbohidratos | 130,65 g | 50 g |
| Fibra bruta | 5,75 g | 2,2 g |
| Fibra alimentaria | 14,89 g | 5,7 g |
| Calcio | 2,06 g | 0,79 g |
| Fósforo | 1,54 g | 0,59 g |
| Potasio | 2,35 g | 0,9 g |
| Sodio | 0,78 g | 0,3 g |
| Cloruro | 1,44 g | 0,55 g |
| Magnesio | 0,1 g | 0,04 g |
| Cobre | 3,92 mg | 1,5 mg |
| Zinc | 44,42 mg | 17 mg |
| Taurina | 0,55 g | 0,21 g |
| Vitamina A | 7839,04 IU | 3000 IU |
| Vitamina E | 159,39 mg | 61 mg |
| Omega 6 | 7,24 g | 2,77 g |
| Omega 3 | 1,59 g | 0,61 g |
| EPA y DHA | 0,68 g | 0,26 g |
| Energía metabolizable* | 383 | |

*Calculada según NRC 2006.

COMPOSICIÓN

Arroz, harina de maíz, harina de trigo, grasas animales, huevo deshidratado, gluten de trigo**, gluten de maíz, minerales, fibras vegetales, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína). Fuentes de proteína: huevo deshidratado, gluten de trigo, gluten de maíz.

**L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.

ADITIVOS (POR KG)***

Aditivos nutricionales: vitamina A: 30000 UI, vitamina D3: 800 UI, E1 (hierro): 63 mg, E2 (yodo): 5,3 mg, E4 (cobre): 14 mg, E5 (manganeso): 66 mg, E6 (zinc): 147 mg, E8 (selenio): 0,16 mg - Conservantes - Antioxidantes.

***Los valores reflejan únicamente los niveles añadidos a la fórmula y no aquellos presentes de forma natural en los componentes de la dieta.





UNA GAMA DE PRODUCTOS ROYAL CANIN® A MEDIDA PARA CADA PROBLEMA URINARIO





ROYAL CANIN IBÉRICA S.A.

Plaza de Carlos Trías Bertrán, 4. 1ª Planta • 28020 Madrid

 CENTRO DE RELACIÓN CON EL CLIENTE | 900 50 46 73 | crc.es@royalcanin.com

www.royalcanin.com/es

Síguenos en     YouTube